MINISTERE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX.
Publication périodique

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN , ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE , RHONE . SAVOIE . HAUTE - SAVOIE

EDITION BAS-VIVARAIS

ABONNEMENT ANNUEL:80 f

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A

(7) 1922 20 30

Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

22 Août 1984

Nº de série continue 81

Bulletin n° 22

ARBORICULTEURS, RESPECTEZ LES DELAIS D'EMPLOI DES PRODUITS AVANT RECOLTE ACARIENS ROUGES. SURVEILLEZ-LES. LES PONTES D'HIVER ONT COMMENCE

ARBRES FRUITIERS

PECHER

<u>Tordeuse Orientale</u> - En toute région, il est nécessaire de maintenir la protection sur les variétés non encore récoltées.

<u>Maladies de conservation</u> - Protégez vos variétés tardives. ATTENTION, certains fongicides ont un délai d'emploi avant récolte à respecter.

<u>Oīdium</u> - Le retour d'un temps orageux, d'une humidité nocturne ou matinale importante et prolongée, favorisera un redémarrage de la maladie. Protégez les plantations où des attaques sont visibles.

Surveillez vos variétés sensibles. La maladie est bien installée dans certains vergers.

PRUNIER

<u>Carpocapse des prunes</u> - ATTENTION, le vol est toujours très soutenu en région tardive (MEYRAS).

POIRIER - POMMIER

<u>Carpocapse</u> - L'activité des papillons reste intense pour tous les postes de piègeages sur pommiers (ST JUST, ST SERNIN, GROSPIERRES). Elle est particulièrement intense à MONTPEZAT, la protection doit être maintenue.

<u>Tordeuse Orientale</u> - En fin de saison, des risques peuvent exister localement à proximité immédiate des plantations de pêchers. Dans les vergers concernés, on utilisera un insecticide type phosalone ou fénitrothion..., homologué à la fois contre les deux ravageurs. DIMILIN et DIMECRON ne sont efficaces que contre le carpocapse.

<u>Tavelure</u> - En présence de tâches, protégez vos vergers <u>avant</u> toute irrigation par dessus, toute pluie, ou toute période d'humidité prolongée.

<u>Maladie de conservation</u> - Nous vous rappelons la nécessité de la protection. Les fongicides préconisés dans notre Bulletin n° 19 du 12 Juillet 1984 sont également efficaces contre la tavelure.

POMMIER

<u>Oïdium</u> - De même que pour le pêcher, la maladie sera favorisée par une humidité atmosphérique élevée. La maladie a été repérée dans certaines plantations.

V I G N E Les données de notre précédent Bulletin restent valables.

BOTRYTIS

N'attendez pas que la véraison soit trop avancée pour traiter.

TORDEUSES DE LA GRAPPE

Aucun traitement pour l'instant.

P206

Imprimerie de la Circonscription RHONE-ALPES. Le Directeur Gérant R. GIREAU Commission Parithire de Presse Nº 1656 AD